



Aves




de la Península de Macanao
y el Parque Nacional Laguna de la Restinga

Alcaldía Península de Macanao
Loro Parque Fundación
The Whitley Laing Foundation
Wildlife Trust



Cuaderno para Colorear

Textos: Adriana Rodríguez-Ferraro y Ana Trujillo
Ilustraciones: Marianna Cisneros S.



Aves de la Península de Macanao y el Parque Nacional Laguna de la Restinga




Alcaldía Península de Macanao
Fundación Empresas Polar
Gobierno de Nueva Esparta
Loro Parque Fundación
The Whitley Laing Foundation
Wildlife Trust

CUADERNO PARA COLOREAR

Textos: **Adriana Rodríguez-Ferraro y Ana Trujillo**

Ilustraciones: **Marianna Cisneros S.**



Indice

Introducción	3
Partes de un ave	5
Cotorra Margariteña	6
Ñangaro	8
Perico Cara Sucia	10
Turpial	12
Pespé o Gonzalito	14
Guayamate o Cardenal	16
Chulinga o Paraulata	18
Pelícano o Alcatraz	20
Gaviota o Tijereta de Mar	22
Atrapamoscas Tijereta	24
Porporo o Bobito	26
Muriquita	28
Garcita Azul	30
María Pollita o Polla de Mangle	32
Chirito de la Virgen o Tucusito	34
Corocora Roja	36
Carpintero	38
Caricari	40
Paloma	42

Cuaderno para colorear:
**AVES DE LA PENÍNSULA DE MACANAO
Y EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DE LA RESTIGA**

Textos:
**ADRIANA RODRÍGUEZ-FERRARO
Y ANA TRUJILLO**

Ilustraciones:
MARIANNA CISNEROS S.

Diagramación:
OSWALDO SALAZAR.

2004

ISBN: 980-6774-00-0
Depósito Legal: lf25220045981077

Introducción

Venezuela tiene la suerte de poseer una gran cantidad de especies de aves. De las tres Islas que forman el Estado Nueva Esparta, Margarita es la de mayor tamaño y en ella podemos observar un gran número de especies de aves y gran variedad de ambientes ideales para éstas: bosques, zonas áridas, costas, lagunas y montañas.

Entre las aves de la Isla de Margarita se destacan las conocidas como “endémicas”, lo que significa que sólo viven en esta zona del mundo, como el ñángaro, la polla de mangle y la macagua; un segundo grupo común y abundante: la chulinga, el perico cara sucia y el guayamate; un tercer grupo de aves escasas y difíciles de observar que se encuentran en **peligro de extinción** como la cotorra margariteña, el flamenco, la macagua y el hormiguerito; y finalmente un cuarto grupo de aves que sólo viven en la isla durante unos meses del año y que vienen desde lugares muy lejanos por lo que son llamadas aves **migratorias**, un ejemplo de ellas es el atrapamoscas tijereta.


Al oeste de la Isla de Margarita se encuentra la hermosa Península de Macanao, donde viven más de 100 especies de aves. Es una zona muy seca y la vegetación que encontramos allí está formada principalmente por plantas con espinas como cardones, tunas, yaque y güíchere. Una parte de la Península, está dentro del Parque Nacional Laguna de La Restinga, donde podemos encontrar varias lagunas rodeadas por manglares.

Con este cuaderno, PROVITA te invita a conocer de una forma divertida un poco más sobre las bellas aves que existen en la Península de Macanao y el Parque Nacional Laguna de La Restinga. Podrás encontrar información importante para identificarlas, características del sitio donde viven, alimentación y las causas por las cuales algunas de ellas están en peligro de extinción. También te presentamos el caso especial de la corocora roja, que anteriormente era muy abundante en la Laguna de La Restinga y que hoy ya no podemos verla porque está **Extinta en la isla.**

Esperamos que te guste este cuaderno, diseñado especialmente para los niños de la Isla de Margarita a fin de que no sólo conozcan sus aves sino que participen en su conservación.

Partes de un Ave


Aquí te presentamos las partes de un ave, que te ayudarán a colorear las que aparecen en este cuaderno.




Cotorra Margariteña (*Amazona barbadensis*)

Esta cotorra es el ave más conocida y querida por los niños de la Isla de Margarita. Se reconoce por su plumaje verde brillante, y su cabeza y hombros amarillos. Vive en las zonas áridas y quebradas de la Península de Macanao, donde se observa en parejas o grupos. Se alimenta principalmente de frutas de yaguarey, yaurero, yaque, palosano y guayacán. Anida en huecos de palosano, guayacán y quebrajacho, donde crían desde 1 hasta 5 pichones.

Es el **Ave Regional del Estado Nueva Esparta** y se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de su ambiente por la explotación de arena en las quebradas donde anida y se alimenta, además del robo de los pichones para ser vendidos como mascotas.




Verde claro : todo el cuerpo
Amarillo : cabeza, hombros, tibia y borde de la cola
Rojo : ojo, plumas del ala
Azul : plumas del ala
Blanco : pico y borde del ojo
Gris : patas




Ñángaro (*Aratinga acuticaudata neoxena*)

Ave endémica de la Isla de Margarita que anida en los huecos de los mangles negros del Parque Nacional Laguna de La Restinga. Es de color verde con la corona azul y el interior de la cola rojo. En las tardes, pueden verse volando en grupos pequeños cuando salen del manglar para alimentarse de frutas de yaguarey, yaurero, túa-túa y guaritoto.

El Ñángaro está en peligro crítico de extinción, y actualmente existen menos de 150 de estas aves, ya que los pichones son robados de sus nidos para tenerlos como mascotas. Únicamente con la colaboración de todos los pobladores de la Isla de Margarita, se podrá evitar la desaparición de esta ave única.




Verde claro : todo el cuerpo
Azul : corona
Blanco : borde del ojo
Rojo : plumas por debajo de la cola
Rosado : pico y patas




Perico Cara Sucia (*Aratinga pertinax*)

Es común en la Península de Macanao y el Parque Nacional Laguna de la Restinga. Se puede ver frecuentemente volando en agitados y ruidosos grupos. Es más pequeño que el Ñángaro y su plumaje es de color verde más oscuro con la cara marrón, razón por la que recibe su nombre. Se alimenta principalmente de frutas (yaguarey, yaurero, guaritoto, túa-túa) y anida en huecos que abre en los comejenes donde ponen entre 7 y 12 huevos. Los pichones nacen ciegos y sin plumas, por lo que los padres deben alimentarlos hasta que puedan volar.




Verde brillante : todo el cuerpo
Marrón : cara y garganta
Negro : pico
Amarillo : borde del ojo
Azul : corona y plumas primarias
Gris : patas



Turpial (*Icterus icterus*)

Es el **Ave Nacional de Venezuela**, y es fácil de observar en Macanao. Se reconoce rápidamente por su plumaje de color naranja brillante y negro. Vuela solo o en parejas buscando su alimento que pueden ser frutas, flores o insectos. Anida en huecos de árboles, en nidos que construye sobre los cardones o en nidos de otras aves, donde generalmente nacen 3 pichones. Su canto es muy melodioso y le sirve para atraer a su pareja.

Debido a su belleza y hermoso canto, muchas personas sacan los pichones de los nidos para venderlos o tenerlos en sus casas como mascotas.




Negro : cabeza, garganta, cola, alas y dorso

Naranja : resto del cuerpo

Azul : borde del ojo


Blanco : manchas del ala

Gris oscuro : pico y patas




Pespé o Gonzalito (*Icterus nigrogularis*)

Es otra ave muy colorida y fácil de observar en la Península de Macanao y el Parque Nacional Laguna de La Restinga. Es de la misma familia que el Turpial, y su cuerpo es de color amarillo con las alas negras. La hembra teje nidos colgantes en forma de bolsas donde pone generalmente 2 huevos blancos con manchas marrones. Se alimenta de frutas, flores, néctar e insectos. Su canto es parecido al del turpial, pero más corto y simple.




Negro: garganta, cola y ala
Amarillo: resto del cuerpo
Gris oscuro: pico y patas



Guayamate o Cardenal (*Cardinalis phoenicius*)

Se encuentra generalmente solo o en parejas, y es muy fácil de observar porque el color rojo brillante de los machos contrasta con el verde de la vegetación. Las hembras son de color marrón con el copete rojo. Se alimenta de insectos, semillas y frutas pequeñas como el pitigüey. La hembra construye el nido en forma de copa con ramitas secas donde pone entre 2 y 4 huevos muy pequeños. Su canto es un silbido muy fuerte.


Los guayamates también son capturados para tenerlos en las casas como mascotas.



Rojo : todo el cuerpo


Negro : ojo y borde del pico

Gris : pico y patas



Chulinga o Paraulata (*Mimus gilvus*)

Es uno de los pájaros más comunes en toda la Isla de Margarita y su plumaje es de color gris, con una cola larga con la punta blanca. Su alimento principal son frutas, insectos y arañas. Es muy agradable escucharla cantar, ya que su canto es muy bello y puede imitar el canto de otras aves. La Chulinga construye un nido abierto con pequeñas ramas y pone de 2 a 4 huevos azules con manchas de color marrón. Son aves muy agresivas al momento de defender su nido del ataque de caricaris y muriquitas.



Amarillo : ojo

Blanco : línea sobre el ojo, garganta y punta de la cola


Gris : todo el cuerpo

Negro : pico y patas



Pelícano o Alcatraz (*Pelecanus occidentalis*)

Es una de las aves marinas más conocidas y es común verle en la Laguna de La Restinga y en todas las costas de la Península de Macanao. Se reconoce fácilmente por su gran tamaño, plumaje de color gris y por la bolsa grande que tiene debajo del pico donde guarda los peces que atrapa en el mar. Pone generalmente tres huevos en un nido que construye sobre manglares, aunque también puede hacerlo sobre el suelo o entre las piedras de la costa. Los pelícanos son muy sociables y viven en grupos que se reúnen todas las tardes para dormir en un mismo lugar. Cuando vuelan van todos juntos formando largas y ordenadas filas.




Blanco : parte superior de la cabeza y cuello

Marrón : parte posterior de la cabeza, cuello y abdomen


Gris claro : pico, ala, dorso y cola

Negro : bolsa y patas



Gaviota o Tijereta de Mar (*Fregata magnificens*)


Es otra ave marina muy común y fácil de observar volando sobre el mar. Su silueta en vuelo es muy atractiva, con alas largas y cola en forma de tijera. Tiene un pico largo en forma de gancho que le permite atrapar los peces de la superficie del agua. En época de reproducción los machos hinchan una bolsa de color rojo que tienen en el buche para atraer a las hembras. Pasan la mayor parte de su vida en el aire, y algunas practican la piratería molestando a otras aves marinas hasta que sueltan sus alimentos, que luego ellas atrapan antes de que caiga al agua.



Negro : cabeza, cuerpo y cola

Rojo : garganta del macho


Gris : pico




Atrapamoscas Tijereta (*Tyrannus savanna*)

Muchos de estos pájaros migratorios visitan la Isla de Margarita cada año entre los meses de mayo y octubre. Vienen desde países lejanos donde hace mucho frío y no tienen alimento durante el invierno. Aquí se alimentan de insectos que capturan mientras vuelan. Su plumaje es de color gris, con la cabeza, la cola y las alas negras. Las plumas exteriores de la cola son mucho más largas que el resto, por ello el nombre de tijereta. Todas las tardes se pueden ver volando hacia la Laguna de La Restinga, donde se reúnen para dormir.

Los atrapamoscas son unas de las víctimas favoritas de algunos niños, quienes causan la muerte a muchas de estas aves, al lanzarles piedras con gomeras o chinas.




Gris claro : dorso
Gris oscuro : alas
Blanco : garganta y abdomen
Negro : cabeza, pico, cola y pata




H.C.

Porporo o Bobito (*Hypnelus ruficollis*)

Es otra ave muy común en la zona. Generalmente se observan porporos solitarios esperando capturar insectos, que son su principal alimento. Anida dentro de los comejenes. Su plumaje es de color marrón y negro, y parece mucho más grande de lo que realmente es debido a que puede erizar sus plumas. También se le llama bobito porque cuando se posa en las ramas de los árboles se queda muy quieto y sin asustarse ante la presencia del hombre. Muchos niños aprovechan la ocasión para lanzarles piedras.



Crema : garganta y abdomen
Naranja claro : ojo
Negro : pico y franjas del abdomen
Blanco : mancha de la cara y del ala
Marrón claro : cabeza, dorso y ala
Gris oscuro : patas y cola



Muriquita (*Otus choliba*)

Como la mayoría de las lechuzas y búhos, las muriquitas son aves nocturnas, lo que quiere decir que duermen durante el día y salen a cazar en la noche; por eso tienen unos ojos muy grandes que les permiten ver en la oscuridad. Su principal alimento son animales pequeños como invertebrados, anfibios, reptiles y aves, a los que captura fácilmente con sus fuertes patas y dedos cubiertos de plumas. Anida en agujeros en los que pone 2 huevos blancos. Aunque no se ve con frecuencia, en la noche es fácil escuchar su canto, el cual es un sonido muy repetitivo.



Marrón oscuro : cabeza, dorso y cola

Marrón claro : abdomen y cara

Gris : patas


Crema : pico, borde alrededor de los ojos

Amarillo : ojos



Garcita Azul (*Egretta caerulea*)


Es una garza pequeña que se observa solitaria y es común en el Parque Nacional Laguna de La Restinga. A pesar de su nombre, el plumaje de su cuerpo es de color grisáceo, con la cabeza y el cuello rojizo. Se caracteriza por tener las patas y el cuello largo con un pico fuerte y afilado. Se paran muy quietas en las lagunas y caños, y se alimentan de peces, cangrejos y otros crustáceos, que capturan con un solo golpe de su pico. Como la mayoría de las garzas, vuela rápidamente cuando ve a alguna persona, y produce un sonido fuerte y ronco.



Rojizo : cabeza y cuello

Gris azulado : resto del cuerpo

Gris claro : patas y pico




María Pollita o Polla de Mangle (*Rallus longirostris margaritae*)

Es otra de las aves endémicas de la Isla de Margarita y vive en el Parque Nacional Laguna de la Restinga entre las raíces del mangle rojo donde se esconde y busca cangrejos y otros animales más pequeños para alimentarse. Construye su nido con ramas sobre las raíces del mangle y desde que nacen los polluelos, son buenos nadadores y se sumergen cuando se sienten en peligro.

Se encuentra en peligro de extinción y en los últimos años su número ha disminuido debido al deterioro y contaminación de los lugares donde vive. Anteriormente también se les cazaba y robaban sus huevos. Es difícil de ver porque es un ave tímida, que se asusta con facilidad y se esconde con rapidez entre las raíces del mangle. Por las tardes se puede escuchar su canto fuerte parecido a un cacareo.




Marrón oscuro : cabeza y dorso
Gris claro : abdomen y vientre
Blanco : garganta y borde del ojo
Negro : parte superior del pico
Naranja : parte inferior del pico y patas




Chirito de la Virgen o Tucusito (*Leucippus fallax*)

Los tucusitos se encuentran entre las aves más bellas que existen, tanto por su minúsculo tamaño como por sus colores brillantes y tornasoles. Sin embargo, el chirito de la Virgen más común en la Península de Macanao y en La Restinga tiene colores pálidos. Los chiritos con su pico largo y delgado se alimentan del néctar de las flores, y mientras se alimentan nunca dejan de mover sus alas, las cuales pueden mover muy rápido. Construyen pequeños nidos en forma de copa, donde pueden poner desde 1 hasta 2 huevos blancos muy pequeños.




Verde : cabeza, alas, dorso y cola
Marrón claro : garganta y abdomen
Blanco : parte interna de la cola
Negro : pico




Corocora Roja (*Eudocimus ruber*)

Es un ave que llama la atención por su plumaje de color rojo con las puntas de las alas negras. Su coloración se debe a su alimentación formada por pequeños animalitos parecidos a los camarones, que atrapan con su pico largo y curvo en las lagunas de aguas saladas. Generalmente viven en grupos y anidan encima de los árboles, principalmente en los manglares.

Seguramente nunca has visto una corocora, esto se debe a que desaparecieron de la Isla de Margarita desde hace muchos años, por lo que se dice que están **EXTINTAS** en la isla. Posiblemente desaparecieron debido a la contaminación, la disminución de aguas dulces, y por las molestias que les causaban las personas en las lagunas de La Restinga y Las Marites, lugares de Margarita donde habitaban estas aves en Margarita.




Rojo : todo el cuerpo
Naranja : pico y patas
Negro : punta de las alas




Carpintero (*Melanerpes rubricapillus*)

Es el único pájaro carpintero que hay en la Isla de Margarita. Es un ave muy común en la Península de Macanao y en el Parque Nacional Laguna de La Restinga, y se observa casi siempre en parejas. Su plumaje es de color blanco y negro con la cabeza roja en los machos y naranja en las hembras. Cuando escuchamos ruidos similares a un martilleo, generalmente se trata de un carpintero golpeando con su pico fuerte y recto los troncos o las ramas de los árboles, abriendo huecos para hacer su nido o buscando pequeños animales. También come frutas como el yaguarey o el yaurero.




Rojo : parte superior y posterior de la cabeza
Blanco : resto de la cabeza, vientre y abdomen
Negro : cola, patas y pico



Caricari (*Polyborus plancus*)

El caricari es el ave rapaz más abundante de la Península de Macanao y del Parque Nacional Laguna de la Restinga. Llama mucho la atención por su pico grueso y poderoso, sus patas largas, y los colores azul, rojo y blanco que tiene en su cabeza, que contrastan con el negro del cuerpo. Los caricaris son carroñeros que se alimentan principalmente de animales muertos, aunque también pueden cazar animales vivos. Son aves sociales y muchas veces se ven en grupos. Anidan sobre los árboles, donde construyen un gran nido de ramas, en el cual la hembra pone entre 2 y 3 huevos blancos.




Azul claro : pico

Rojo : cara desde el pico hasta detrás del ojo

Blanco : cabeza, cuello y plumas debajo de la cola


Negro : parte superior de la cabeza, penacho, abdomen y punta de la cola

Amarillo : patas



Paloma (*Columba corensis*)

Parientes de las tortolitas, potocos y guarames, las palomas son las de mayor tamaño de su familia y se identifican fácilmente por la mancha blanca que tienen en las alas. Se pueden observar volando en grupos por toda la Península y el Parque Nacional, sobre todo en horas de la tarde cuando se reúnen a dormir. Se alimentan de frutas y semillas. La hembra construye un nido sencillo entre las ramas hecho con palitos, donde ponen de 1 a 2 huevos blancos que incuban ambos padres.



Rosado : cabeza, cuello y abdomen

Blanco : borde del ala


Gris: vientre y cola

Marrón : dorso y ala

Rojo : patas






Amarillo : pico

Azul : borde del ojo





Alcaldía Península de Macanao
Fundación Empresas Polar
Gobierno de Nueva Esparta
Loro Parque Fundación
The Whitley Laing Foundation
Wildlife Trust



Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de:





ALCALDIA PENINSULA
DE MACANÁ



The Whitley Laing Foundation

LORO PARQUE
FUNDACIÓN



Diseño de Portada e impresión
Imprenta Oficial del Estado Nueva Esparta